



Jelenia Góra, dnia 14 stycznia 2025 r.

# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Jeleniej Górze

Wg rozdzielnika



Nasz znak: PIWz.5101.CHZ.1.2025

Dot. sprawy:

pismo z dnia:

W związku z potwierdzeniem wystąpienia w dniu 10 stycznia 2025 r. ogniska pryszczycy (FMD) w Niemczech w pobliżu Berlina oraz wysokim ryzyku zawleczenia choroby do Polski, przesyłam najważniejsze informacje dotyczące ww. choroby. Załączam również ulotkę informacyjną skierowaną głównie do hodowców zwierząt – proszę o jej zamieszczenie na terenie Państwa gmin oraz urzędów.

Pryszczycza (FMD) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy.

Ostatni przypadek FMD w Polsce stwierdzono w 1971 r. Polska jest uznana za kraj urzędowo wolny od tej choroby przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt. Pryszczycza jest chorobą kategorii A i podlega w Polsce obowiązkowi zwalczania. Zwalczenie FMD w stadzie odbywa się poprzez zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok. Za zwierzęta zabite przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi FMD, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli. Straty te powodowane są upadkami zwierząt z gatunków wrażliwych, kosztami likwidacji ognisk choroby oraz wypłacanych odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu zwierząt z gatunków wrażliwych, mięsa tych zwierząt oraz produktów pozyskiwanych od tych zwierząt.

Ludzie są wrażliwi na zakażenie, jednakże pryszczycza u ludzi nie jest śmiertelna i zwykle przebiega łagodnie. Ludzie zarażają się w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym zwierzęciem, jak również spożycia mięsa, mleka i niepasteryzowanych przetworów mlecznych pochodzących od zakażonego zwierzęcia.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wojewódzka 5M,  
58-560 Jelenia Góra

tel.: 75 753-47-14, e-mail: [jelenia.gora@wroc.wiw.gov.pl](mailto:jelenia.gora@wroc.wiw.gov.pl),

[www.piw.jelenia-gora.pl](http://www.piw.jelenia-gora.pl)

Okres inkubacji choroby wynosi do 14 dni (najczęściej od 3 do 8 dni) w przypadku bydła i świń, oraz do 21 dni w przypadku owiec i kóz. Główne objawy choroby to występowanie: pęcherzy wypełnionych płynem na skórze i błonach śluzowych w jamie ustnej, na racicach, na strzykach; kulawizn; intensywnego ślinotoku; gorączki. Zwierzęta są apatyczne i osowiałe, u bydła mlecznego występuje znaczący spadek produkcji mleka.

Więcej informacji dotyczących pryszczycy oraz wywołującego ją wirusa zostało zamieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze w zakładce PRYSZCZYCA (FMD) [http://www.piwjg.hekko.pl/?page\\_id=1176](http://www.piwjg.hekko.pl/?page_id=1176).

Zapraszam do zapoznania się z materiałami.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Jeleniej Górze  
lek. wet. Renata Pastuch

Załączniki:

1. ulotka informacyjna FMD

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze -Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
2. Urząd Miasta Jelenia Góra – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry;
3. Urzędy Miasta i Gmin - Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego – na obszarze powiatu karkonoskiego;
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra;
5. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Jelenia Góra;
6. Dolnośląska Izba Rolnicza – Biuro Terenowe w Jeleniej Górze;
7. Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, na terenie powiatu karkonoskiego i Miasta jeleniej Góry
8. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze;
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
10. a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wojewódzka 5M,  
58-560 Jelenia Góra

tel.: 75 753-47-14, e-mail: [jelenia.gora@wroc.wiw.gov.pl](mailto:jelenia.gora@wroc.wiw.gov.pl),

[www.piw.jelenia-gora.pl](http://www.piw.jelenia-gora.pl)




## Zawiadomienie o zagrożeniu wystąpienia pryszczycy

### (FMD)

W dniu 10 stycznia 2025 r. potwierdzono ognisko pryszczycy w Niemczech w pobliżu Berlina. Choroba wystąpiła u 3 bawołów (w niewielkim gospodarstwie utrzymującym 14 sztuk bawołów). Pozostałe zwierzęta w gospodarstwie zostały uśmiercone. Wokół ogniska choroby w promieniu 3 i 10 km wyznaczono obszar zagrożony i zapowietrzony.

### Outbreak DE-FMD-2025-00001



Pryszczycyca (FMD) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy.

Ostatni przypadek FMD w Polsce stwierdzono w 1971 r. Polska jest uznana za kraj urzędowo wolny od tej choroby przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt.

Pryszczycyca jest chorobą kategorii A – zwalczaną z urzędu. Jej wystąpienie powoduje bardzo duże straty ekonomiczne:

- ✓ duże upadki zwierząt wrażliwych
- ✓ konieczność likwidacji ognisk oraz wypłaty odszkodowań
- ✓ wstrzymanie obrotu i eksportu zwierząt z gatunków wrażliwych,
- ✓ mięsa tych zwierząt oraz produktów pozyskiwanych od tych zwierząt

### Pryszczycza u ludzi

Ludzie są wrażliwi na zakażenie, jednakże pryszczycza u ludzi nie jest śmiertelna i zwykle przebiega łagodnie. Ludzie zarażają się w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym zwierzęciem oraz w wyniku spożycia mięso, mleko i niepasteryzowanych przetworów mlecznych pochodzących od zakażonego zwierzęcia.

### Objawy pryszczycy:

- ✓ okres inkubacji: bydło i świnie - do 14 dni (najczęściej od 3 do 8 dni), owce i kozy - do 21 dni,
- ✓ **pęcherzyki, pęcherze i bąble występujące na w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyraccowej i na koronkach racic, po ich pęknięciu – pojawiają się nadżerki,**
- ✓ temperatura ciała podwyższona o 1,5 - 2,5°C,
- ✓ apatia,
- ✓ **obfite ślinienie,**
- ✓ spadek mleczności aż do całkowitego zaniku,
- ✓ utrudnione przeżuwanie i utrata łaknienia,
- ✓ otwieranie jamy ustnej z charakterystycznym cmokaniem,
- ✓ kulawizna jednocześnie na wiele kończyn, sztywny chód,
- ✓ wśród dorosłych zwierząt śmiertelność jest niewielka,
- ✓ zwierzęta młode (cielęta, prosięta, jagnięta) są bardzo wrażliwe i często padają z powodu zapalenia mięśnia sercowego bez innych oznak choroby.

**Posiadacz zwierzęcia (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami) ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu ww. objawów choroby zakaźnej u zwierząt.**

### Przebieg pryszczycy u bydła

Przebieg choroby u bydła jest gwałtowny. Zakażenie szerzy się błyskawicznie i w ciągu 24-48 h w gospodarstwie mogą chorować wszystkie zwierzęta. Śmiertelność u osobników dorosłych jest zazwyczaj niska lub nie występuje wcale. U cieląt w wyniku zapalenia mięśnia sercowego śmiertelność osiąga około 50%.

### Przebieg pryszczycy u świń

Choroba rozprzestrzenia się błyskawicznie. Zakażone świnie poruszają się niechętnie, często pozostają w pozycji leżącej, a zmuszone do ruchu, kuleją i chodzą opierając się na czubkach racic. Ciężarne lochy często ronią. Śmiertelność prosiąt ssących jest bardzo wysoka.



### Przebieg pryszczycy u owiec i kóz

Rozprzestrzenienie choroby w stadzie owiec i kóz jest mniej gwałtowne niż u świń i bydła. Choroba przebiega łagodnie bez wyraźnie zaznaczonych objawów ogólnych i klinicznych. Pęcherzyki tworzą się wokół koronki racicy oraz pomiędzy racicami, w jamie ustnej pęcherzyki małych rozmiarów mogą rozwijać się na języku oraz na dziąsłach, a ich rozwój jest szybki i z tego powodu trudny do uchwycenia. U owiec objawem, który powinien nasuwać podejrzenie pryszczycy jest nagłe wystąpienie kulawizn u znacznego odsetka zwierząt oraz wysoki wskaźnik jagniąt padłych w okresie wykotów.

### Drogi zakażenia

Wirus wydalany jest przez zakażone zwierzę jeszcze przed wystąpieniem u niego objawów chorobowych. **Zakażone i chore na pryszczycę zwierzęta wydają wirus z wydychanym powietrzem, z ich wydzielinami oraz wydaliniami. Największa koncentracja wirusa znajduje się w płynie surowicznym i nabłonku pojawiających się pęcherzy. Zwierzęta mogą być nosicielami wirusa nawet do trzech lat.**

#### Źródła zakażenia:

- ✓ kontakt ze zwierzętami chorymi lub po przechorowaniu,
- ✓ skażona ślina, mleko i jego przetwory, kał, pasza, woda, żłoby, podłogi, pastwiska, skóra, wełna, ręce i odzież obsługi,
- ✓ skażone mięso i jego przetwory,
- ✓ skażone nasienie i zarodki,
- ✓ skażone środki transportu, gryzonie, ptaki

### Transmisja wirusa z wiatrem

- ✓ **Przenoszenie się choroby z wiatrem nad lądem odbywa się najczęściej na odległość do 10 kilometrów.**
- ✓ **Istnieje ryzyko transmisji wirusa z wiatrem i zakażenia zwierząt oddalonych od ogniska, pomiędzy którymi nie doszło do bezpośredniego kontaktu.**

### Ochrona zwierząt przed chorobą

W celu ochrony stada przez wniknięciem wirusa pryszczycy należy pamiętać, żeby zwierzęta wprowadzane do niego pochodziły z wiadomego źródła i były zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny.

Okres inkubacji choroby wynosi do 14 dni (najczęściej od 3 do 8 dni) w przypadku bydła i świń, oraz do 21 dni w przypadku owiec i kóz. Główne objawy choroby to występowanie: pęcherzy wypełnionych płynem na skórze i błonach śluzowych w jamie ustnej, na racicach, na strzykach; kulawizn; intensywnego ślinotoku; gorączki. Zwierzęta są apatyczne i osowiałe, u bydła mlecznego występuje znaczący spadek produkcji mleka.

Więcej informacji dotyczących pryszczycy oraz wywołującego ją wirusa zostało zamieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze w zakładce PRYSZCZYCA (FMD) [http://www.piwjg.hekko.pl/?page\\_id=1176](http://www.piwjg.hekko.pl/?page_id=1176).

Zapraszam do zapoznania się z materiałami.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Jeleniej Górze  
lek. wet. Katarzyna Pastuch

Załączniki:

1. ulotka informacyjna FMD

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze -Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
2. Urząd Miasta Jelenia Góra – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jeleniej Góry;
3. Urzędy Miasta i Gmin - Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego – na obszarze powiatu karkonoskiego;
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra;
5. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Jelenia Góra;
6. Dolnośląska Izba Rolnicza – Biuro Terenowe w Jeleniej Górze;
7. Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, na terenie powiatu karkonoskiego i Miasta Jeleniej Góry
8. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze;
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze
10. a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wojewódzka 5M,  
58-560 Jelenia Góra

tel.: 75 753-47-14, e-mail: [jelenia.gora@wroc.wiwi.gov.pl](mailto:jelenia.gora@wroc.wiwi.gov.pl),

[www.piw.jelenia-gora.pl](http://www.piw.jelenia-gora.pl)